

- pharmazeutische Hautdesinfektion
- bakterizid, levurizid, mycobakterizid, begrenzt viruzid
- wirksam gegen Noro- und Rotaviren
- ohne Parfüm und Farbzusätze
- wirksam gem. RKI Wirkungsbereich A



RHEOSEPT-Hautdesinfektion

Hautdesinfektion - 2-Propanol 70 % (V / V) Lösung

Produktbeschreibung

Hautdesinfektion als Arzneimittel

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, mycobakterizid, begrenzt viruzid.
Wirksam gegen Noro- und Rota-Virus.

Anwendungsbereiche

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, für Kühlumschläge, sowie zur hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Anwendungshinweise

Darreichungsform und Inhalt: Lösung, 250 ml. **Stoff- oder Indikationsgruppe:** Desinfektionsmittel.
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der

RHEOSEPT®

Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten (wirksam auch ab 3 Minuten gem. Gutachten). Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. RHEOSEPT-Hautdesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Desinfektionsmittel für die Anwendung durch Angehörige eines Heilberufes oder speziell eingewiesene Personen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dicht verschlossen aufbewahren. **Hinweise:** Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. **Gegenanzeigen:** RHEOSEPT-Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit RHEOSEPT-Hautdesinfektion können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Anwendungskonzentrationen

Dosiertvorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
1 Minute lang feucht halten	unverdünnt	einfache Injektionen, vor Punktionen von Gelenken
10 Minuten lang feucht halten	unverdünnt	Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	hygienische Händedesinfektion (EN 1500)
Einwirkzeit 3 Minuten	unverdünnt	chirurgische Händedesinfektion (EN 12791)
Einwirkzeit 15 Sekunden	unverdünnt	bakterizid (EN 13727) / levurozid (EN 13624)
Einwirkzeit 15 Sekunden	unverdünnt	mycobakterizid (EN 14348) hohe Belastung
Einwirkzeit 30 Sekunden	unverdünnt	begrenzt viruzid (EN 14476 - HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) - niedrige Belastung
Einwirkzeit 2 Minuten	unverdünnt	Norovirus (EN 14476)
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Norovirus (RKI / DVV)
Einwirkzeit 15 Sekunden	unverdünnt	Rotavirus (RKI / DVV)

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g. Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Physikalisch-chemische Daten

➤ Flammpunkt >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370 + P378 - Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
- P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
29022320	RHEOSEPT- Hautdesinfektion Sprayflasche 250 ml	Karton

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Zulassung

Zulassungsnummer: 1599.98.99

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.